

29年7月

重点品目野菜について病害虫の予防の徹底を図りましょう！

農薬散布される前に防除日誌を確認し、使用回数等使用基準を厳守！

○白ねぎ・・・お盆時期からさび病の予防を開始しましょう

予防の時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用時期・回数
8月	サビ病 ヨトウムシ	ディアナ SC	2500～ 5000倍	収穫前日まで 2回以内
	黒斑・葉枯 べと・さび病	テーク水和剤	600倍	収穫14日前まで 3回以内
	トリフミン葉枯症 黒斑病	ロブラール水和剤	1000～ 1500倍	収穫14日前まで 3回以内

夏休み後の土寄せは気温下がってから！！

○ナス・・・雨がなくてもダニの発生に注意しましょう

予防の時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用時期・回数
8月上旬	ハダニ	スターマイトフロアブル	2000倍	収穫前日まで 1回以内
		ダブルフェースフロアブル		
	褐色腐敗病	ランマンフロアブル	2000倍	収穫前日まで 4回以内
8月中下旬	ヨトウムシ オオタバコガ	フェニックス顆粒水和剤	2000～ 4000倍	収穫前日まで 3回以内
	褐色腐敗病	プロホース顆粒水溶剤	1000倍	収穫前日まで 4回以内

※雨や強風の後、「褐色腐敗病」が多発しますので、必ず防除してください。

○ミニトマト・・・単価の高い9月出荷にむけてトマトトーン処理はていねいに！

予防の時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用時期・回数
8月	オオタバコガ アザミウマ	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで 3回以内
	斑点病 灰色かび病	ロブラール水和剤	1000倍	収穫前日まで 3回以内
	すすかび病	トリフミン水和剤	3000倍	収穫前日まで 5回以内

※梅雨明け後の遮光資材の設置・病害虫防除の徹底と灌水を定期的に行ってください。

○ピーマン・・・降雨後はヘタの痛みに注意して出荷をお願いします！

予防の時期	対象病害虫	農薬名	希釈倍率	使用時期・回数
8月	オオタバコガ アザミウマ	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで 2回以内
	うどんこ病 斑点病	カスミンボルドー	1000倍	収穫前日まで 5回以内

※尻腐れ（カルシウム欠乏症状）予防のためカルプラスを定期的散布してください。